

Pediatric Gastroenterology & Nutrition

PREPARACIÓN DE LOS INTESTINOS (Limpieza)

Para poder ver adecuadamente el tejido del colon, es importante limpiar completamente el colon de feces. Hay dos métodos para esto: Medicina de Limpieza y Dieta. Usted puede seguir dándole a su niño sus medicinas regulares con la excepción de hierro. El hierro debe dejar de dársele 2 días antes de la colonoscopia.

Medicación: Comenzar MIRALAX el _____ continuar por 2 días.
(Siga las instrucciones de la receta de MIRALAX)

Miralax es un laxante suave y de buen gusto que debería ser tomado por al menos 2 días completos antes de la colonoscopia. Si es necesario, le proveeremos la receta para éste producto. Éste se puede mezclar con una bebida clara que su niño escoja.

Laxantes adicionales: _____

Dieta: Tomar solamente líquidos claros el día anterior al procedimiento
(NO SE PERMITE LECHE!!! Ver la sugerencia de líquidos claros abajo)

Recomendamos el día anterior al procedimiento, la dieta contiene solamente **líquidos claros** para reducir la cantidad de feces. Ésto puede incluir jugo de manzana o uva blanca, gelatina, Pedialyte y Pedialyte Pops, heladitos de agua y caldo claro. **Por favor evite ingerir cualquier bebida roja porque ésto complica la evaluación del tejido digestivo durante el procedimiento.**

**** Asegúrese de parar las medicinas orales, bebidas y comidas cuando se le ha instruído antes del procedimiento para poder dar el sedante. Si su niño toma medicina para convulsiones, por favor pregúntenos para clarificar cuando puede darle ésas medicinas antes del procedimiento.**

Si su niño no puede completar la preparación de los intestinos ó se enferma (fiebre, vómitos ó síntomas respiratorios) dentro de 48 horas del procedimiento, por favor comuníquese con nuestra oficina, puede ser que tengamos que cambiar a una preparación de intestinos diferente, ó cambiar la fecha del procedimiento. Los números de nuestra oficina son: (206) 215-2700.