

# ការពិតអំពីជម្ងឺរបេង (TB)

Tuberculosis (TB) Facts (Khmer)

# ការបង្ហាញអំពី TB

## តើអ្វីទៅជា TB ?

"TB" គឺជាអក្សរកាត់របស់ជម្ងឺមួយដែលមានឈ្មោះថា ជម្ងឺរបេង ។ TB សាយភាយក្នុងខ្យល់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ។ មេរោគរបេង (TB) ឆ្លងតាមរយៈខ្យល់នៅពេលនរណាម្នាក់ ដែលមានជម្ងឺរបេងស្ងួត ឬឈឺបំពង់ក ក្អក និងយាយ សើច ច្រៀង ឬកណ្តាស ។ អ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកជម្ងឺរបេង អាចស្រូបខ្យល់មានមេរោគរបេង TB ចូលទៅក្នុង សួតរបស់ពួកគេ ។ មេរោគរបេង (TB) អាចរស់នៅក្នុងរាង កាយរបស់លោកអ្នកដោយមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺ ។

គេហៅថា **ការចម្លងរបេង (TB) ជំនឿមស្ងួត** ។ នេះមានន័យថាការអ្នកមានផ្ទុកតែមេរោគរបេង (TB) អសកម្ម (សម្ងំ) នៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ មេរោគ អសកម្មនេះ មិនអាចឆ្លងទៅលើមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតបាន នោះទេ ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើមេរោគទាំងនេះ បានវិវឌ្ឍន៍ពេញ លក្ខណៈ ឬក្លាយជាសកម្មក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នក និងកើនឡើងច្រើន លោកអ្នកនឹងឈឺដោយសារ **ជម្ងឺរបេង (TB)** ។

នៅពេលមេរោគរបេង (TB) ធ្វើសកម្មភាព (កើនឡើង ច្រើនក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នក) គេឲ្យឈ្មោះវាថា **ជម្ងឺរបេង (TB)** ។ មេរោគទាំងនេះជាធម្មតាវាយប្រហារទៅលើសួត ។ ពួកវាអាចវាយប្រហារទៅលើផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយ ផងដែរដូចជា ក្រលៀន ខួរក្បាល ឬឆ្អឹងខ្នង ។ **ជម្ងឺរបេង (TB)** នឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺ ។ អ្នកជម្ងឺរបេង (TB) អាចចម្លងមេរោគ នេះទៅ អោយមនុស្សដែលពួកគេចំណាយពេលនៅជាមួយ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។

## តើខ្ញុំឆ្លងមេរោគរបេង (TB) តាមរបៀបណា?

លោកអ្នកអាចឆ្លងមេរោគរបេង (TB) ប្រសិនបើលោកអ្នក ចំណាយពេលនៅក្បែរអ្នកជម្ងឺរបេងស្ងួត ឬឈឺបំពង់ក ។ លោកអ្នកអាចឆ្លង ដោយការដកដង្ហើមចូលនូវមេរោគរបេង (TB) តែម្យ៉ាងគត់ ដែលអ្នកជំងឺក្នុងបរិយាកាស ។ លោកអ្នកមិនអាចឆ្លងមេរោគរបេង (TB) ពីសំលៀកបំពាក់របស់ នរណាម្នាក់ កែវផឹកទឹក គ្រឿងប្រដាប់ញ្ចាំអាហារ ការចាប់ដៃ បង្គន់ ឬកន្លែងផ្សេងៗទៀត ដែលអ្នកជម្ងឺរបេង(TB) ស្ថិតនៅ នោះឡើយ ។

## តើខ្ញុំដឹងដោយវិធីណា ប្រសិនបើខ្ញុំបានឆ្លងមេរោគរបេង (TB) ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដែល មានជម្ងឺរបេង (TB) លោកអ្នកគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ លោកអ្នក ឬមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក ដើម្បី ធ្វើតេស្ត ។

ការធ្វើតេស្តមានពីរបៀប ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីជួយស្រាវជ្រាវរក**ការឆ្លងមេរោគរបេង (TB) :** ការធ្វើតេស្តស្បែករកមេរោគរបេង(TB) ឬការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគរបេង(TB) ។ ការធ្វើតេស្តស្បែក ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បំផុត ។ មូលដ្ឋានមួយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ សម្ភារៈធ្វើតេស្តមួយចំនួន ដែលឲ្យឈ្មោះថា tuberculin នៅ ក្រោមស្បែក ។ ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ លោកអ្នកត្រូវត្រឡប់ ទៅរកបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ដែលនឹងត្រួតពិនិត្យ ដើម្បី រកមើល ថាតើមានប្រតិកម្មចំពោះការធ្វើតេស្ត ឬយ៉ាងណា ។ ក្នុងករណីខ្លះ ការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគរបេង(TB) ត្រូវបានគេ ប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើតេស្តរកមើល**ការឆ្លងមេរោគរបេង (TB)** ។ ការធ្វើតេស្តឈាមនេះ វាស់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សាវរស មនុស្សម្នាក់ មានប្រតិកម្មជាមួយមេរោគដែលបង្កឲ្យកើតរបេង (TB) ។

ដើម្បីប្រាប់ ថាតើនរណាម្នាក់មាន**ជម្ងឺរបេង (TB)** ការធ្វើតេស្តផ្សេងៗដូចជា ការឆ្លុះអេកូដើមទ្រូង និងគំរូនៃ កំហាក (ស្បែកដែលត្រូវបានក្អកចេញពីក្នុងសួតជ្រៅ) អាចនឹង ត្រូវការ ។



ការធ្វើតេស្តស្បែករកមេរោគរបេង (TB)



ការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគរបេង (TB)



ថ្នាំរបេង (TB)

<http://www.cdc.gov/tb>

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ ការការពារមេរោគ ហ៊ីវ/ ជម្ងឺអេសដី ការរលាករង្វើមដោយវិរុស រោគ STD និង រោគរបេង (TB) នាយកដ្ឋានកំចាត់រោគរបេង

